

PREPARO DE EXAMES/ PROCEDIMENTO

SETOR:	LABORATÓRIO
EXAME:	TGP /ALT
MÉTODO:	Cinético UV
INDICAÇÃO:	O teste tem utilidade na avaliação de hepatopatias, tendo sensibilidade para detectar lesão hepatocítica e sendo recomendado para o rastreamento de hepatites. Aumentos de transaminase glutâmico-pirúvica (TGP) podem ocasionalmente ser vistos em doenças extra-hepáticas, como miopatias. A presença de outras enzimas, como creatinofosfoquinase (CPK), desidrogenase láctica (DHL), aldolase e transaminase glutâmico-oxalacética (TGO), pode definir o estado de miopatia. A TGP é menos sensível que a TGO para a avaliação de hepatopatia alcoólica.
ORIENTAÇÕES GERAIS:	Levar pedido médico e estar atento às orientações de preparo do laboratório.
PREPARO:	<ul style="list-style-type: none">✓ Jejum de 4 horas;✓ Para a realização deste exame, é necessário não ter feito biópsia hepática nos últimos 5 dias.
VALOR DE REFERÊNCIA:	Homem: até 41 U/L Mulher: até 31 U/L
TELEFONE DE CONTATO:	(27) 2121-3743