

PREPARO DE EXAMES/ PROCEDIMENTO

| | |
|-----------------------------|---|
| SETOR: | LABORATÓRIO |
| EXAME: | TGO /AST |
| MÉTODO: | Cinético UV |
| INDICAÇÃO: | <p>A transaminase glutâmico-oxalacética (TGO) não é exclusivamente utilizada para a avaliação da integridade dos hepatócitos. A determinação da atividade sérica dessa enzima pode ser útil em hepatopatias e miopatias. Na fase aguda da hepatite viral, valores de TGO superiores ao normal em cerca de 20 vezes ou mais são quase sempre encontrados. Seus níveis também se elevam na hepatite alcoólica e em necroses hepatocíticas tóxicas ou isquêmicas, assim como na mononucleose, na qual, entretanto, a desidrogenase láctica (DHL) aumenta mais.</p> <p>Em miopatias, são também observados aumentos de TGO, da mesma forma que de outras enzimas, como a creatinofosfoquinase (CPK) e a DHL. A TGO ainda pode se elevar em infartos renais e pulmonares ou em grandes tumores, sendo acompanhada, em tais casos, de aumentos de DHL, e igualmente no mixedema, nas anemias hemolíticas e em choque. Como a enzima está presente nos eritrócitos, a ocorrência de hemólise amplia sua atividade no soro.</p> |
| ORIENTAÇÕES GERAIS: | Levar pedido médico e estar atento às orientações de preparo do laboratório. |
| PREPARO: | <ul style="list-style-type: none">✓ Jejum de 4 horas✓ Para a realizar este teste, o cliente não pode ter feito eletroneuromiografia nos últimos três dias nem biópsia muscular ou hepática nos últimos 5 dias. |
| VALOR DE REFERÊNCIA: | Homem: até 37 U/L Mulher: até 31 U/L |
| TELEFONE DE CONTATO: | (27) 2121-3743 |